Conocimientos básicos sobre mamíferos andaluces

Biología y situación

Orden *Rodentia*

- **Familia *Sciuridae***
- **Familia *Gliridae***
- **Familia *Muridae***
- **Familia *Gricitidae***

Familia *Sciuridae*

- **Género *Sciurus***

Sciurus vulgaris



- Hábitat

En la Península Ibérica reside en todas las series forestales de la región eurosiberiana y en setos arbolados, pero en la mediterránea, solo en pinares, desde los basales de pino carrasco a los culminales de pino albar y negro.

- Alimentación

Come fundamentalmente frutos y semillas, sobre todo piñones. También consume hongos, caracoles y larvas de insectos.

- Reproducción

Especie aparentemente polígama. Hembras preñadas desde diciembre a septiembre, pero la mayoría de las camadas nacen en enero-marzo y mayo-julio. Las hembras maduras son capaces de producir dos camadas.

- Etología

Especie activa todo el año y diurna. El tamaño de los dominios vitales varía entre 2 y 15 ha.



Familia *Gliridae*

- **Género *Eliomys***

Eliomys quercinus (Liró



- Hábitat

Se encuentra en hábitats muy variados. Son característicos de zonas donde existen cúmulos de rocas grandes, o entre los muros de piedra que delimitan caminos y separan cultivos. También se encuentra en pinares y encinares, pero también en bosques caducifolios.

- Alimentación

Se trata de una especie fundamentalmente insectívora, aunque dependiendo de la disponibilidad también consumen frutos y semillas. Huevos, pollos, miel e incluso otros micromamíferos también pueden formar parte de su dieta.

- Reproducción

La reproducción se extiende desde febrero a octubre. El número anual de camadas por hembra varía de uno a tres, y el tamaño de camada entre 4 y 8. Puede haber nidos comunales de hasta tres hembras.

- Etología

Son activos trepadores, aunque sus desplazamientos más frecuentes son sobre el suelo. Viven en grupos familiares de un número variable de individuos. Área de campeo relativamente constante, de aproximadamente 2.500 m^2. Puede presentar estivación



Familia *Muridae*

- **Género *Apodemus***
- **Género *Mus***
- **Género *Rattus***

Apodemus sylvatic
campo



- Hábitat

Se encuentra en la península Ibérica tanto en dunas costeras, estepas cerealistas, matorrales y todo tipo de bosques como en jardines urbanos y periurbanos.

- Alimentación

Son animales omnívoros, alimentándose fundamentalmente de semillas (70-80%) y alimento de origen animal como pequeños invertebrados (20%).



- Reproducción

La temporada reproductora se concentra desde finales de otoño hasta principios de primavera.

- Etología

Es una especie de hábitos principalmente nocturnos. El tamaño del área de campeo del ratón de campo varía entre 0,2 y 3,7 has.

Mus musculus (Ratón común)



- Hábitat

Es un animal predominantemente comensal que puede vivir en cualquier lugar donde pueda encontrar comida.

- Alimentación

Los animales que habitan lugares humanizados son omnívoros, mientras que las formas asilvestradas se alimentan principalmente de semillas, frutos y pequeños invertebrados.



- Reproducción

El ciclo reproductor de las poblaciones comensales es continuo a lo largo de todo el año.

- Etología

El ratón casero es esencialmente. En las poblaciones comensales es primariamente territorial, mientras que en las poblaciones silvestres muestran dominancia social dictada por su tamaño corporal.

Mus spretus (Ratón

- Hábitat

El ratón moruno es una especie silvestre, no comensal. Tiene preferencia por los espacios abiertos ocupando gran variedad de hábitats como áreas de matorral bajo, praderas, dehesas, ambientes rocosos, marismas, ecotonos y campos de cultivo.

- Alimentación

El ratón moruno presenta una dieta granívora-omnívora muy variada, fundamentalmente vegetal, incluyendo semillas, brotes, tallos de plantas y frutos, completada con invertebrados como insectos (principalmente larvas) y lombrices.

- Reproducción

En el sur peninsular el periodo reproductivo tiene picos de máxima actividad en abril-mayo y agosto-septiembre.

- Étología

Especie básicamente nocturna. Generalmente sedentarios, lo que sugiere organización territorial por dominancia.

Los ratones morunos presentan comportamiento de ocultar alimento para utilizarlo posteriormente.



Rattus norve
(Rata parc



- Hábitat

Es un roedor comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos y rurales.

- Alimentación

Es una especie omnívora y oportunista, con una dieta muy variada.

- Reproducción

En medios urbanos, con suficientes alimentos y ambiente estable, la rata parda se reproduce durante todo el añ manteniéndose grávidas el 30% de las hembras adulta En poblaciones no comensales el ciclo sexual es estacional.



- Etología

Vive en clanes familiares formados por un macho dominan un harén de hembras y una serie de machos subordinados. Es una especie eminentemente noctur crepuscular. Pueden realizar desplazamientos nocturn relativamente largos, de hasta 3 ó 4 km, en busca de alimentos.

Rattus rattus (Rata

- Hábitat

Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque mediterráneo, plantaciones, bosques caducifolios. También puede vivir en núcleos urbanos, normalmente de pequeño tamaño. Construye nidos aéreos y también excava madrigueras subterráneas en la base de los árboles, utilizando sus raíces como soporte.

- Alimentación

Es una especie omnívora, capaz de comer cualquier alimento a su alcance, sobre todo en áreas urbanizadas. En el n natural suelen ser frugívoras y granívoras sin desdeñ los insectos y otros invertebrados.



- Reproducción

En las poblaciones silvestres existe un ciclo reproductor estacional definido, que comienza en febrero y final octubre.

- Etología

Suelen vivir en grupos jerarquizados dominados por un n adulto y dos hembras subordinadas. Ws una especie eminentemente crepuscular y nocturna, aunque es observarla desplazándose durante el día.

Familia *Gricetidae*

- **Género *Arvicola***
- **Género *Chionomys***
- **Género *Microtus***

Chionomys nivalis (Topil

- Hábitat

Especie propia de canchales de zonas montañosas. Muestran preferencia por canchales con grandes rocas y con un alto grado de irregularidade
Selecciona positivamer
junto a zonas con dom

- Alimentación

El topillo nival es una especi
consumiendo todas las
hojas, frutos, cortezas

- Reproducción

Su período reproductor se i
septiembre. Lospartos

- Etología

Durante el verano los machos adultos poseen áreas de campeo que se solapan extensamente, mientras que las de las hembras prácticamente no se superponen, lo que sugiere que éstas son territoriales. Las áreas de campeo de ambos sexos se solapan considerablemente lo que parece indicar un sistema de apareamiento promiscuo.

Arvicola sapidus (Rata



- Hábitat

Es un roedor semiacuático que vive casi siempre ligado a la presencia de cursos o masas de agua estable con abundante vegetación herbácea o matorral en sus márgenes. Prefiere las orillas de escasa pendiente y de textu de madrigueras.



- Alimentación

La dieta es fundamentalı por tallos y hojas de las especies vegetales d nsumo esporádico de presas animales, cor

- Reproducción

En las poblaciones ibéric › incluso abarcar todo el año.

- Etología

Las ratas de agua son activas tanto de día como de noche, y presentan un ritmo de actividad sincronizado con el ciclo luminoso. Los periodos de máxima actividad tienen lugar al final de la mañana y durante la primera mitad de la tarde.

Microtus cabrerae (Topillo de Cabrera)



- Hábitat

Habita exclusivamente zonas climáticas estrictamente mediterráneas, rechazando los climas eurosiberianos. Esta especie precisa una cob[illegible] que se establece en áreas con el nivel freático elevado[illegible] menor medida, carrizales y vegetación nitrófila de [illegible]



- Alimentación

La dieta se basa principalmen[illegible]s, acompañadas por juncos y, en menor medida, po[illegible] buyen en una proporción muy baja de la dieta.

- Reproducción

La época de cría puede varia[illegible]tor en el topillo de Cabrera están muy influidas por [illegible] casas precipitaciones.

- Etología

Organización social monógar[illegible] ocupan territorios exclusivos, frente a otros adultos del mismo sexo, en los que viven sus descendientes hasta que alcanzan el estado de subadulto. Desarrolla su actividad (tanto nocturna como diurna) principalmente sobre el suelo, en el que deja marcados unos caminos característicos, aunque también puede construir nidos subterráneos en áreas con vegetación herbácea escasa.

Microtus duodecimcos
mediterrán



- Hábitat

Es una especie de espacios abiertos y con influencia mediterránea, tanto naturales como agrícolas. Su presencia está condicionada por la existencia de suelos estables, húmedos, fáciles de excavar y con abundante cobertur



- Alimentación

La dieta está constituida gran variedad de especies. También ir es atacan sólo la corteza descarnando la base

- Reproducción

El período reproductor e rante todo el año, con un mínimo reproduc la reproducción disminuye durante e

- Comportamiento

Es una especie fosora que excava con la ayuda de los incisivos y las extremidades anteriores. Las galerías están muy ramificadas y suelen presentar un único nido y varias cámaras para el almacenamiento de alimentos. Manifiesta hábitos superficiales nocturnos. Es una especie monógama y colonial.

Orden *Lagomorpha*

- **Familia *Leporidae***

Familia Leporidae

- **Género *Lepus***

- **Género *Oryctolagus***

Lepus granatensis (L



- Hábitat

Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios abiertos, destacando los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo. En el norte de la Península ocupa matorrales de pie de monte en diferentes etapas de sucesión así como pastizales de montaña.



- Alimentación

Tienen hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose varios individuos en las zonas de alimentación. C principalmente gramíneas, ocasionalmente ramonear plantas leñosas para conseguir alguno tallos o cortezas.

- Reproducción

Presenta actividad reproductora durante todo el año c máximos entre febrero y junio.

- Comportamiento

De hábitos solitarios, pasa el día encamada en depresio ella misma construye y que se denominan “camas”.. LIeva a cabo desplazamientos diarios Al atardecer sale del encame para alimentarse, pudiendo formar grupos y solapar sus áreas de campeo entre las zonas de alimentación y encame.

Oryctolagus cuniculus



- Hábitat

Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde presenta mayores abundancias es el matorral mediterráneo, especialmente si existen zonas cultivadas y el relieve es llano o medianamente ondulado.

- Alimentación

Fitófago con doble digestión (asemejándose a los rumiantes). conejo es capaz de acomodar su dieta en función de disponibilidad resultante de la competencia con el rest de los herbívoros. En general seleccionan mu positivamente las compuestas, leguminosas y gramínea vivaces.

- Reproducción

Es una de las pocas especies de vertebrados en las que hembra puede estar receptiva todo el año. En término generales, la reproducción suele acontecer entr noviembre y junio. Entre dos y cuatro camadas.

- Comportamiento

Por lo general vive en madrigueras que albergan grupo sociales cuyo tamaño depende del tamaño de la conejera, de la calidad y estructura del hábitat. El área de campeo es de 1 a 2 ha.

Orden *Soricomorpha*

- **Familia *Soricidae***

- **Familia *Talpidae***

Familia *Soricidae*

- **Género *Crocidura***
- **Género *Neomys***
- **Género *Suncus***

Crocidura russula (Musar

- Hábitat

Prefiere hábitats abiertos y los márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura del suelo. También apar boscosas con sotobosque claro. As es y granjas, especialmente en in



- Alimentación

Está constituida principa ominan miriápodos, isópodos, arácnidos, e puede ingerir materia vegetal.

- Reproducción

El período reproductor v de la temperatura y la humedad. En el norc ıtras que en zonas más meridionales puede

- Amenazas

Es una especie relativamente sociable. El territorio que ocupa es reducido y se solapa considerablemente con el de las musarañas vecinas. En invierno es frecuente la utilización de nidos compartidos, con lo que la tasa metabólica en reposo se reduce un 20%.

Crocidura suaveolens
campo)



- Hábitat

En la Península Ibérica ocupa gran cantidad de medios en la zona de influencia atlántica, mientr ada a los ambientes húmedos.

- Alimentación

Consume todo tipo d y larvas, ocasionalmente míferos y partes verdes de planta

- Reproducción

El periodo reproduct

- Comportamiento

Muestran tendencia a formar grupos sociales. Los machos adultos presentan los mayores territorios (de 20 a 63 m) mientras que en las hembras adultas y juveniles son menores (de 10 a 45 m).

Neomys anon
(Musgaño de Ca

- Hábitat

Es un insectívoro semiacuático que si bien vive ligado generalmente a biotopos húmedos puede [redacted] los cursos de agua.

- Alimentación

Presenta una dieta e[redacted] dulceacuícolas como terrestres, [redacted] imentación, siendo particularmente [redacted], gasterópodos y anélidos.



- Reproducción

La actividad sexual c[redacted] al inicio del otoño.

- Amenazas

Se desconoce la organización social y el comportamiento del musgaño de Cabrera en condiciones naturales.

Suncus etruscus
(Musgaño enano)

- Hábitat

Es una especie de requerimientos típicamente mediterráneos. Habita sobre todo lugares abiertos y es frecuente en olivare donados. También puede ocupar bosques poc estos ambientes, se refugia casi siempre getación herbácea.

- Alimentación

Presenta una dieta carní animal, exceptuando aquéllas protegidas A lo largo del día, llega a consumir el equiva

- Reproducción

El ciclo reproductor en la en otoño.

- Amenazas

En general, se manifiesta como una especie sociable, aunque el grado de competencia intraespecífica depende de la época del año, del estado sexual y de la abundancia de alimento. Así, mientras que durante el período reproductor presenta una comportamiento sexual promiscuo y existe una fuerte atracción social entre los individuos emparentados, durante la etapa de reposo sexual aumenta la agresividad intraespecífica en ambos sexos. Hábitos nocturnos.

Familia *Talpidae*

- **Género *Talpa***

Talpa occidentalis

- Hábitat

Los requerimientos, en cuanto al hábitat, deben tener suelos aptos para ser excavados y abundancia de presas.

- Alimentación

Se alimenta de lombrices, larvas de insectos (Melolontha, Lucanus), ropalóceros, cochinillas, ciempiés, milpiés, grillos, moluscos y otros invertebrados, siendo significativa la presencia de Dendrobaena sp. y Allolobophora sp.

- Reproducción

Periodo de celo de marzo a mayo, pariendo normalmen cuatro crías y teniendo la inmensa mayoría de las hembra un solo parto.

- Amenazas

Los topos raramente salen a la superficie, salvo para busc agua o durante el período de dispersión juvenil. Viven e una intrincada red de túneles. Son territoriales y existe túneles de paso compartidos por varios individuos.



Orden Erinaceomorpha

- **Familia *Erinaceidae***

Familia *Erinaceidae*

- **Género *Atelerix***

- **Género *Erinaceus***

Atelerix algirus (Eriz

- Hábitat

Desde zonas forestales y de matorral, hasta huertas e inmediaciones de asentamientos urbanos, incluso en solares y arroyos del interior de núcleos urbanos.

- Alimentación

Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados (insectos, isópodos terrestres, miriápodos, pequeñ caracoles), si bien ocasionalmente también consun pequeños vertebrados (principalmente salamanqu

- Reproducción

El nacimiento de las crías tiene lugar entre junio y octub un máximo entre la segunda quincena de julio y la de septiembre. Celo entre febrero y abril.

- Comportamiento

Es un animal nocturno, con un ciclo polifásico de activid en verano se distribuye principalmente en dos fase pequeños picos accesorios. Hiberna ocasionalment enero y marzo.

Erinaceus europaeus (Eri

- Hábitat

Ocupa un rango muy amplio de hábitats, tanto abiertos como. Prefiere las zonas más húmedas, como los bosques. También prefiere los medios semiurbanos, incluyendo jardines.

- Alimentación

Se alimenta de todo tipo de invertebrados, principalmente insectos y lombrices, también depreda babosas y caracoles. Tampoco desdeñan huevos, pollos de aves, cr de roedores y carroña.



- Reproducción

El período reproductor se extiende desde abril a agosto. Suel tener una sola camada por temporada, aunque algunas hembras pueden tener una segunda.

- Comportamiento

Son animales solitarios aunque tolerantes desde el punto de vista territorial. Su área de campeo varía entre 20 y 30 h para los machos y unas 10 ha para las hembras. Hiberna desde noviembre o diciembre hasta marzo. Construyen nidos para hibernar y criar, pero durante la estación favorable simplemente se refugian en la vegetación espesa, cambiando frecuentemente de refugio.

Orden *Artiodactyla*

- **Familia *Suidae***
- **Familia *Bovidae***
- **Familia *Cervidae***

Familia *Suidae*

- **Género *Sus***

Sus scrofa (Jabalí



- Hábitat

Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas, periferias urbanas e incluso se registran indicios de su actividad en pastos subalpinos.

- Alimentación

Omnívoro con dieta de predominio vegetal y una elevada frecuencia de aparición de materia animal, cuantitativamente poco relevante. Gran variabilidad en las dietas locales, compuesta desde frutos de fagáceas a productos agrícolas, raíces y hongos. Composición de la dieta animal muy variable con predominio de invertebrados, anfibios y micromamíferos.

- Reproducción

En la mayoría de las poblaciones se registra un período de celo principal en o entre septiembre y diciembre, y el consiguiente período de partos que extiende entre enero y abril.



- Amenazas

La unidad básica es el grupo matriarcal compuesto por una o diversas hembr adultas acompañadas de sus jóvenes; otros núcleos están constituidos machos jóvenes. Los machos adultos son solitarios. Actividad nocturn crepuscular. Se han descrito áreas de campeo anuales de 12 a 15.000 los machos y de hasta 6.000 ha en las hembras.

Familia *Bovidae*

- **Género *Ammotragus***
- **Género *Capra***
- **Género *Ovis***

Ammotragus ler



- Hábitat

Tienden a habitar terrenos rocosos y escarpados, prefiriendo zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría (primavera), zonas bosc (celo) e invierno; aunqu frecuentan zonas bosco



- Alimentación

Es un herbívoro de carácter g de todo tipo de herbáce dependiendo de la disp

- Reproducción

La principal época de celo es promedio de 5,5 meses primavera siguiente.

- Amenazas

Es una especie gregaria, caracterizada por la segregación de sexos fuera de la época de celo. Es una especie promiscua en la que el rango social del macho determina el acceso a las hembras. No es territorial. El área de campeo puede alcanzar las 3.300 ha, destacando la dispersión estival.

Capra pyrenaica (Cab



- Hábitat

Utiliza preferentemente zonas con matorral, matorral con arbolado y arbolados de coníferas. Ocupa un amplio rango altitudinal.

- Alimentación

Los estudios efectuados sobre la alime[illegible]o a las condiciones del medio donde viven. Cuando predominan los p[illegible]an, la cabra suele ser ramoneadora.



- Reproducción

Es una especie polígama. El período de [illegible]cen entre abril y junio.

- Comportamiento

Es un animal gregario, siendo los rebañ[illegible]exos separados durante la mayor parte del mismo.

Ovis aires (Mu



- Hábitat

Tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes como las zonas de cumbres deforestadas y rocosas de Cazorla, los bosques húmedos de Cádiz, o las agrestes y secas laderas del Teide.

- Alimentación

La característica más relevante de la alimentación del muflón es la gran adaptación que presenta a cualquier tipo de hábitat, siendo posiblemente una de las especies de herbívoro que más especies diferentes consume por ingesta, llegándose a encontrar más de 100 variedades diferentes en un solo estómago.

- Reproducción

El período de celo se sitúa en el mes de novie



- Amenazas

Se puede decir que es un animal social duran

Familia *Cervidae*

- **Género *Capreolus***
- **Género *Cervus***
- **Género *Dama***

Capreolus capreolu



- Hábitat

Ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento.



- Alimentación

Muestra un compo sumiendo preferentemen con bajo contenido en fi

- Reproducción

Los nacimientos ti unio, y el período de celo tiene lu

- Amenazas

Es una especie de hábitos solitarios, si bien las condiciones del hábitat pueden determinar comportamientos más gregarios.

Cervus elaphus (Ciervo



- Hábitat

Ocupa la mayoría de los hábitats de la Península, desde llanuras a nivel del mar hasta áreas de alta montaña. Utiliza preferentemente las áreas de transición (ecotonos) entre zonas boscosas o arbustivas y áreas abiertas donde exista producción de pla



- Alimentación

La alimentación es mixta ent especies tanto herbáceas (en primavera alcanza e hábitats abiertos o de escasa cobertura vegeta más cobertura.

- Reproducción

El celo tiene lugar entre sept onido característico conocido como berrea c cimientos ocurren entre mayo y junio.

- Amenazas

Durante la mayor parte del a s el grupo familiar de hembras, formado por una hembra y sus descendientes de los últimos dos o tres años. Las hijas suelen permanecer con las madres hasta que crían por primera vez, y cuando se separan utilizan áreas de campeo que se solapan. Los machos se dispersan a partir de los dos años. En ecosistemas mediterráneos los machos utilizan áreas de campeo anuales de entre 600 y 1.000 ha, y las hembras de unas 300 ha.

Dama dama (Ga



- Hábitat

A pesar de estar presente en casi todos los tipos de climas, excepto en
glaciación fue uno d
regresar a ella. Esto,
adaptativa, la nieve



- Alimentación

Se alimenta casi exclusiv
en claros, bordes de

- Reproducción

Es una especie polígama
cierto rango de varia

- Amenazas

No son animales territoriales (en ocasiones, durante el celo, los machos pueden serlo) y tanto machos como hembras viven casi todo el año separados.

Orden *Carnivora*

- **Familia *Herpestidae***
- **Familia *Canidae***
- **Familia *Felidae***
- **Familia *Viverridae***
- **Familia *Mustilidae***

Familia *Herpestidae*

- **Género *Herpestes***

Herpestes ichneun

- Hábitat

Los hábitats preferidos son los de mayor cobertura vegetal, como el maquis mediterráneo espeso. Presenta gran preferencia por las orillas de arroyos y zonas húmedas con vegetación densa de zarzales, adelfas, juncos, etc.

- Alimentación

Es un depredador oportunista que consume siempre las presas mas abundantes y disponibles. En su dieta dominan los conejos jóvenes y micromamíferos, aunque también incluyen con frecuencia insectos (principalmente coleópteros y ortópteros), aves, carroña, anfibios, reptiles, crustác frutos, setas, etc.

- Reproducción

Los partos tienen lugar fundamentalmente entre mayo y septiembre.

- Comportamiento

Se pueden observar grupos de cinco a seis individuos, aunque lo común es par o individuos solitarios. Los machos adultos son más solitarios que hembras y los jóvenes, que son los más vistos en grupo. Los jóvenes independizan cuando comienza el siguiente período reproductor, y no raro que el presunto padre de los jóvenes acompañe al resto de la fam Con frecuencia comparten madrigueras, que suelen ser vivares de cone tejoneras, o marañas muy densas de vegetación, y comienzan la activi casi exclusivamente diurna al mismo tiempo.



Familia *Canidae*

- **Género *Canis***

- **Género *Vulpes***

Canis lupus (Lobo



- Hábitat

Es una especie generalista capaz de vivir en cualquier medio donde encuentre alimento.

- Alimentación

Es esencialmente carnívoro, cazador de ungulados, tanto silvestres como domésticos, aunque su oportunismo le permite consumir todo tipo de presas y, ocasionalm frutos. Consume carroña con frecuencia.



- Reproducción

El celo se produce entre enero y abril, la hembra pare abril y junio cinco o seis lobeznos, que abandona madriguera a las seis u ocho semanas y que acompañ los padres a cazar a partir de los cinco meses de edad.

- Amenazas

Los lobos son carnívoros sociales que viven en man jerarquizadas compuestas por una pareja reproduct sus crías de varios años. Las manadas ocupan territ de 100 a 500 km^2.

Vulpes vulpes (Zorrc



- Hábitat

El zorro habita todo tipo de ambientes, tanto en medios forestales como en espacios abiertos, e incluso ciudades. Le favorecen más los hábitats diversos y fragmentados que los homogéneos.

- Alimentación

El zorro es un carnívoro oportunista, cuya dieta se basa en aquellos recursos más abundantes o más fáciles de obtener en un momento dado. No obstante, durante la época de crianza de los cachorros el zorro prefiere presas de tamaño mediano, como el conejo (*Oryctolagus cuniculus*), que resultan energéticamente más rentables. Además, consume micromamíferos, carroña de ungulados domésticos o salvajes, galliformes, frutos e invertebrados. En ambientes humanizados, más de la mitad de la d zorro la integran las basuras y las carroñas de animales domésticos.



- Reproducción

Los apareamientos suelen tener lugar en enero y febrero. La lactancia du semanas.

- Comportamiento

Su actividad es fundamentalmente nocturna, con picos en el orto y oc actividad diurna es mayor en áreas poco frecuentadas y cuando las son cortas. El tamaño del área de campeo, así como su gr solapamiento, dependen de la abundancia y la distribución de los rec

Familia *Felidae*

- **Género *Felis***

- **Género *Lynx***

Felis silvestris (Gatc

- Hábitat

Aunque el gato montés puede vivir en sotos fluviales y hábitats más o menos esteparios, necesita de masas forestales importantes cercanasTrabajos recientes en España indican que el mosaico de matorral, bosque mediterráneo y cultivos de secano es de gran importancia para la presencia de este félido.



- Alimentación

Se alimenta fundamentalmente de micromamíferos y aves, pero en la Iberia mediterránea el conejo (*Oryctolagus cuniculus*) constituye la base de su dieta.

- Reproducción

El celo suele desarrollarse entre enero y marzo, la gestación dura una media de 66 días y los partos, generalmente de dos o tres crías, se producen entre abril y mayo.

- Comportamiento

Es de hábitos solitarios. Tan sólo durante el celo, machos y hembras están juntos unos pocos días, volviendo enseguida a su vida solitaria. Después del parto, la hembr comparte el territorio con sus crías hasta que éstas se independizan.

Lynx pardinus (Lince ib



- Hábitat

Los linces adultos seleccionan positivamente áreas con matorral mediterráneo. Raramente se alejan más de 1 km de este hábitat preferido, donde obtienen el 75% de su alimento.

- Alimentación

Es una especie estenófaga. En las localidades donde se ha estudiado su dieta, el conejo (Oryctolagus cuniculus) supone más del 90% de la biomasa consumida. Ciervos (Cervus elaphus), gamos (Dama dama), perdices (Alectoris rufa), micromamíferos y anátidas son otras presas capturadas ocasionalmente.

- Reproducción

Las hembras crían una vez al año y no todos los años. A menudo la primera reproducción se retrasa hasta el tercer o cuarto año factores sociales o ambientales. Los partos tienen lugar entre marzo



- Comportamiento

Los linces son solitarios y territoriales. Defienden con exclusividad el cen área de campeo ante individuos subadultos o adultos del mismo se áreas de campeo de adultos residentes es algo mayor en machos (1 que en hembras (8,7 km2). Esta población es monógama con tend poliginia. Las hembras paren en cuevas y troncos huecos.

Familia *Viverridae*

- **Género *Genetta***

Genetta genet



- Hábitat

Se le considera un animal forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos, pero realmente se comporta de modo generalista en la selección del hábitat. Es muy abundante en las dehesas de encina, roble y alcornoque, en áreas de matorral mediterráneo, en olivares, fresnedas y en general en cualquier tipo de vegetación de ribera.

- Alimentación

Es un carnívoro cazador y eurífago que consume principalmente roed
su dieta se caracteriza por la flexibilidad y el oportunismo. Ca
aves de campo y de corral, mamíferos hasta del tamaño d
reptiles, anfibios, insectos, miriápodos, caracoles, peces, can
consumen frutos, hierba y huevos, y prácticamente nunca carr



- Reproducción

El celo comienza en enero y acaba en septiembre, con un máximo
marzo y un segundo pico a partir de mayo. La gestación dura
semanas. Los partos tienen lugar entre marzo y noviembre.

- Comportamiento

Las ginetas se reconocen individual y socialmente a través del mar
Entre individuos de igual sexo no hay solapamiento en el uso d
que sugiere un comportamiento territorial.

Familia *Mustelidae*

- **Género *Lutra***
- **Género *Martes***
- **Género *Meles***
- **Género *Mustela***

Lutra lutra (Nu

- Hábitat

Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales suficientemente bien conservados, y en el litoral atlánti...



- Alimentación

La práctica totalidad de sus semiacuáticos, siendo de ella. Come principa culebras de agua, aun aves, otros reptiles e i

- Reproducción

Especie poliestra y polígam todo el año en funció el medio.

- Comportamiento

Es una especie solitaria, excepto durante los apareamientos, la época de crianza y, a veces, el período de inicio de la dispersión. Posee unos elevados requerimientos espaciales, generalmente de decenas de kilómetros.

Martes foina (Gardui

- Hábitat

Ocupa una gran diversidad de hábitats, desde zonas de estepa, bosque mediterráneo adehesado, y bosque caducifolio a de coníferas. Se adapta particularmente bien a ambientes rupícolas, pero lo más característico e ombre.



- Alimentación

Su alimentación es típica eta se basa en micromamíferos y a ye también a pequeños reptiles, y estaciona

- Reproducción

El celo ocurre entre juni y abril.

- Comportamiento

Es una especie territorial, vive en solitario y el territorio de las parejas reproductoras tan sólo coincide parcialmente durante la época de celo. El tamaño de su territorio es muy variable, dependiendo de la disponibilidad de alimento, de hasta 2 km^2.

Meles meles (T

- Hábitat

Ocupan bosques caducifolios, mixtos y de coníferas y paisajes agro-silvo-pastorales con setos.

- Alimentación

Es un omnívoro que consume raíces, frutos, setas, hongos subterráneos, moluscos, otros invertebrados, anfibios, reptiles y carroña.

- Reproducción

Los partos ocurren de noviembre a enero, siendo el celo a pocas semanas del parto.

- Comportamiento

Viven en territorios en los que al menos están presentes hembra y un macho adultos y las crías del año. El tar del territorio depende de su riqueza, y de la distribu espacial de la presa principal. Donde el alimento es abundante, formándose grupos familiares con un gr número de individuos. Los tejones son nocturnos y descansan durante el día en madrigueras subterráne



Mustela nivalis (Comad



- Hábitat

Selecciona los hábitats por la abundancia de micromamíferos que viven en ellos, y puede encontrarse en bosques abiertos, campos de cultivo, praderas, bosques de ribera y prados alpinos. También incluye en sus áreas de campeo huertas y prados próximos a las viviendas humanas.

- Alimentación

Es un depredador especializado en roedores de tamaño medio siendo los topillos los más abundantes en su dieta. Cuando los micromamíferos son escasos, puede alimentarse de huevos, pollos de aves y lagomorfos y, ocasionalmente, puede incluir insectos, lagartos, anfibi lombrices y hasta carroña.



- Reproducción

El período de actividad sexual se extiende entre marzo y juli Los nacimientos suceden a finales de julio-agosto.

- Comportamiento

Son carnívoros solitarios y territoriales.

Mustela putorius (

- Hábitat

Es generalista en cuanto a hábitat, vive en ambientes tan diversos como bosques caducifolios, de coníferas, espesuras de matorral, lagunas, zonas cultivadas, etc.

- Alimentación

Presenta un amplio espectro trófico, aunque intermedio entre los generalistas típicos y las otras especies del género Mustela. Su dieta varía según las regiones y tipos de hábitat, aunque existen dos tipos de presas que predominan claramente, los micromamíferos y los anfibios. En España, los turones meridionales han desplazado sus preferencias hacia el conejo.



- Reproducción

El celo tiene lugar durante la primavera (marzo-mayo), pudiéndose acoplar los machos con varias hembras.

- Comportamiento

Muestra costumbres estrictamente solitarias (excepto durante la época de reproducción) y aparentemente es el más nocturno de las especies del género Mustela. El área de campeo es de tamaño muy variable, entre 1 y 11 km2, siendo mayor el de los machos.

Orden *Chiroptera*

- **Familia *Vespertilionidae***
- **Familia *Rhinolophidae***
- **Familia *Molossidae***

Familia *Vespertilionidae*

- Género *Barbastella*
- Género *Eptesicus*
- Género *Hypsugo*
- Género *Miniopterus*
- Género *Myotis*
- Género *Nyctalus*
- Género *Pipistrellus*
- Género *Plecotus*

Barbastella barbastellus (B

- Hábitat

Especie citada en zonas montañosas, en ambientes con espacios arbolados. Se refugia tanto en árboles, como en casas y refugios subterráneos, en este último caso sobre todo en invierno.

- Alimentación

Se trata de un murciélago que consume casi exclusiva pequeños lepidópteros y, en menor proporción, grupos de pequeños insectos voladores. También e de capturar presas directamente del suelo o la vege

- Reproducción

Hay observaciones de adultos con crías a partir de media junio.

- Comportamiento

Murciélago poco gregario. El tamaño de las colonias conocen suele ser de unos pocos individuos. Consi como sedentario. Se ha constatado desplazamier 10-75 km entre los refugios de invierno y de verano

Eptesicus serotinus/is
(Murciélago horte



- Hábitat

Utilizan como refugios naturales las fisuras en rocas y en mucha menor proporción huecos de árboles. Se han adaptado perfectamente a los resquicios que existen en todo tipo de construcciones humanas de manera que en la actualidad la mayor parte de los refugios conocidos se encuentran en juntas de dilatación, cajas de persianas. Caza a unos 5 ó 15 m sobre el suelo en una gran variedad de hábitats. En Andalucía busca alimento preferentemente sobre pequeños cursos de agua con alguna vegetación rupícola, donde encuentra mayor densidad de presas que en zonas de cultivo de cereales y olivos.



- Alimentación

Mayoritariamente se alimenta de coleópteros y en menor proporción de lepidópteros, dípteros y hemípteros. Es un típico cazador aéreo au ocasionalmente puede capturar presas sobre superficies.

- Reproducción

Los partos tienen lugar mayoritariamente entre la segunda quincena de j la primera de julio y la lactancia se extiende hasta mediados de ag

- Comportamiento

Las hembras forman colonias de cría de hasta más de un centenar de ind dependiendo del tamaño del refugio. Los machos adultos durante primavera y verano se muestran solitarios o forman pequeños gru otros refugios. Es una especie básicamente sedentaria.

Hypsugo savii (Murcié montaña)

- Hábitat

Considerada a menudo una especie característica de zonas rocosas y montañosas, ocupa sin embargo una mayor variedad de hábitats, desde valles amplios y sin roquedos hasta acantilados costeros o de montaña, desde medios rurales con pequeños núcleos habitados y un paisaje en mosaico de arbolado, cultivos y pastos hasta parques y ciudades. Los refugios se sitúan en grietas de farallone rocosos, árboles y edificaciones, raramente en medios subterráneos.

- Alimentación

Consumo preferente de lepidópteros, dípteros, neuróptero himenópteros y hemípteros, que captura en vuelo, rectilíneo y no muy rápido, entre 5 y 10 m de altura sc las copas de los árboles, bordes de acantilados, medic acuáticos y también en torno al alumbrado urbano.



- Reproducción

Época de partos entre mediados de junio y mediados de ju El apareamiento se produce entre finales de agosto y septiembre.

- Comportamiento

Especie generalmente solitaria excepto en el período de apareamiento y en las colonias de cría. Especie migradora.

Miniopterus schreibersii (Murciélago de cueva)

- Hábitat

Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi exclusivamente en cavidades naturales, minas y túneles. Los refugios se sitúan tanto en el dominio termomediterráneo, como supramediterráneo, en áreas montañosas o llanas, con o sin cobertura vegetal.



- Alimentación

Se desconoce la dieta. Caza en espacios abiertos o por en de la vegetación. Las áreas de caza pueden estar a v decenas de kilómetros de sus refugios.

- Reproducción

El apareamiento tiene lugar a principios del otoño. Los pa tienen lugar entre finales de junio y principios de ju

- Comportamiento

Es una especie muy gregaria, que forma colonias de cient miles de individuos durante todo el año. Migradora estacional.

Myotis bechsteinii (Raton



- Hábitat

Presentes en medios forestales tanto en bosques caducifolios como de coníferas. Se refugia en minas, simas y cuevas. Taml

- Alimentación

Caza a baja altura pudien ...oles como en el suelo. Se alimenta de maripos

- Reproducción

El apareamiento tiene lu... ...son ocupados entre finales de abril y may... ...pios de julio.

- Comportamiento

Hibernan en solitario. Las ... ...ata de una especie sedentaria con un de...

Myotis blythii (Ratone

- Hábitat

Es una especie típica de estepas y praderas, que se ha extendido usando de forma secundaria los prados de siega y pastizales artificiales. Utiliza como refugios cavidades subterráneas y, en menor medida, desvanes de edificios, aljibes y bunkers.

- Alimentación

Cazan ortópteros y coleópteros del género *Melolontha*. Para capturar los *Melolontha*, vuela sobre los árboles, cazándolos en vuelo o s



- Reproducción

Reproducción con separación de sex r miles. Los apareamientos empiezan en ago s de hasta cinco hembras.

- Comportamiento

Forma grandes colonias de cría, que de kilómetros de sus refugios habit

Myotis capaccinii (Rato

- Hábitat

Es una especie termófila. Los refugios suelen estar cerca de ecosistemas acuáticos (ríos, pantanos, zonas húmedas) ya que éste es su hábitat [illegible]nización de construcciones con condiciones muy s[illegible]

- Alimentación

Captura artrópodos de pequ[illegible]perimentalmente se ha demostrado que la esp[illegible]vor sobre aguas calmadas y sin vegetación debido a[illegible]

- Reproducción

Las colonias de parto en nue[illegible]600 individuos. Éstos son relativamente tempran[illegible]

- Comportamiento

Es una especie gregaria tant[illegible]n con M. schreibersii, aunque también se asc[illegible]endencia a la segregación sexual. A partir de med[illegible]le pueden permanecer hasta abril, cuando las hembras se concentran en las colonias de cría. Realiza desplazamientos locales entre refugios dado que no ocupa los mismos refugios en verano que en invierno.

Myotis daubentonii ribereño)

- Hábitat

Suele estar relacionado con cursos o masas de agua. Habitualmente las zonas de caza están en estos lugares o zonas próximas. Puede ocupar una gran variedad de refugios tanto invernales como estivales: hue
o en rocas, desvanes, túneles



- Alimentación

Consumen principalmente dípteros,
neurópteros. Algunos crustác

- Reproducción

La mayoría de los apareamientos se
la Península Ibérica, en Aragó
hembras terminan de amama

- Comportamiento

Las colonias de cría están constituida
ó 100 individuos. Los machos
pequeños grupos de hasta 20
pequeños o medianos, a vece
agrupaciones estables de poc
desplazamientos entre refugi
km. Habitualmente los refugi
esta especie está considerada como sedentaria.

Myotis emarginatus (Ra

- Hábitat

Vive en todo tipo de hábitats, aunque parece evitar los bosques muy cerrados. Su presencia se ve favorecida por una orografía accidentada.



- Alimentación

La alimentación se basa en c ién caza insectos en vuelo.

- Reproducción

Los nacimientos se produce En los Países Bajos las hembras alcanzan la m conocida, de un ejemplar de Polonia, es de 22 a

- Comportamiento

Es de costumbres caverníco ras, suelen oscilar entre varias decenas y dos ce a Mancha. Las cuevas en las que cría en Andalucía c la siempre forma colonias mixtas con Rhinolophu rte aunque se mantiene esta tendencia también aparecen colonias monoespecíficas. En Aragón se conoce una colonia mixta con M. nattereri. Esta diferencia norte-sur también se refleja en el tipo de refugio elegido predominando los edificios en el norte y las cavidades en el sur. Al contrario que en Europa central donde forman conspicuas colonias de hibernación, en España desaparecen durante el invierno y excepto algún ejemplar aislado no vuelven a ser vistos en los refugios hasta la primavera.

Myotis myotis (Raton



- Hábitat

Bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. Refugios en cavidades subterráneas, desvanes cálidos y sótanos



- Alimentación

En Suiza comen insectos no
con vuelo lento a 30-7(
evitando herbazales de
capturándola con la bo

- Reproducción

Forman parideras a finales c
junio

- Comportamiento

Gregario durante la cría, cor
partir de marzo. Vuelve
harenes con hasta tres hembras. Hibernación poco conocida, con animales solitarios o pequeños grupos, nunca grandes colonias. No se aleja más de 50 km de sus refugios habituales.

Myotis nattereri/escale gris)

- Hábitat

Presenta una gran valencia ecológica. Utiliza todo tipo de refugios tanto cavernícolas como fisuras, huecos de árboles y cajas nido.



- Alimentación

Caza principalmente presas recoge de la superficie la vegetación. Tambié varía mucho según la otros, dípteros (cerato anisopódidos y múscid arácnidos.

- Reproducción

La gestación efectiva dura n de mediados de mayo

- Comportamiento

Dentro de las cuevas puede formar piñas conspicuas colgando libres del techo o utilizar grietas y huecos dentro de la misma cavidad. El tamaño de la colonia depende del espacio del refugio no pasando de 20-30 individuos en huecos y fisuras y llegando a varios centenares en refugios tipo cueva. Se considera una especie sedentaria.

Nyctalus lasiopterus (Nó

- Hábitat

Parece estar básicamente asociado a bosques de caducifolios aunque se ha encontrado también en pinares. Requiere bosques maduros con árboles viejos en los que encuentra oc
una gran capacidad de despla
caza muy distantes de los refug



- Alimentación

Típico cazador aéreo con dieta ampl
pequeñas aves capturadas en v

- Reproducción

Los partos (una o dos crías) son a
hembras amamantan hasta, al r

- Comportamiento

Forman colonias de cría de hasta 80 h
próximos y que se disgregan
migratorios estacionales. Su a
perdura a lo largo de toda la nc
despejadas de fondos de valle y

Nyctalus leisleri (Nóctu



- Hábitat

Especie de hábitos eminentemente forestales, aparece habitualmente en áreas boscosas de orografía irregular, tanto en ambientes eurosiberianos (hayedos, robledales, pinares y abetales) como mediterráneos (hayedos, rebollares, alcornocales, quejigales, pinares y pinsapares

- Alimentación

Se ha observado cazando dípteros como principales pres seguidos de tricópteros, lepidópteros y coleópteros.



- Reproducción

Las colonias de cría se establecen en mayo, los partos tie lugar a primeros de junio.

- Comportamiento

Especie migratoria y gregaria en época de cría. Crean har de hasta nueve hembras. El nóctulo pequeño es un cazador aéreo que captura sus presas en vuelo por de las copas de los árboles. Comienza su actividad ju atardecer.

Nyctalus noctula (Nóctu



- Hábitat

Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse en huecos de árboles, aunque también es posible hallarlo en cajas-refugio o en grieta



- Alimentación

Es un típico cazador aéreo, q
en vuelo, aunque ocasio
también en el suelo. Ac
dípteros, coleópteros, t

- Reproducción

Los partos producen entre fi

- Comportamiento

Los nóctulos medianos son p
del verano, las colonias
desplazan hacia el sur recorriendo cientos de kilometros. Suele cazar insectos voladores por encima de los 15 m de altura (a veces a más de 50 m), en zonas despejadas como bordes de bosques y parques, riberas de ríos, vertederos e incluso sobre el alumbrado público de pueblos y ciudades. Aunque frecuentemente caza en las proximidades de su refugio diurno (menos de 3 km).

Pipistrellus kuhlii (Murciéla claro)



- Hábitat

Es fisurícola, tanto litófila como fitófila, y altamente sinantrópica, refugiándose en fisuras o grietas en edificios, rocas y árboles, así como en cajas-nido. Habita tanto en zonas de bosque abierto como en zonas humanizadas, continuo y rápido. Prefiere zonas abiertas tales como campos y cursos de agua.

- Alimentación

Consume una gran variedad de insectos, desde quironómidos, hasta coleópteros del género octubre los culícidos y lepidópteros constituyen



- Reproducción

Las hembras pueden comenzar a agregarse en colo desde finales de marzo, o bien esperar hasta el en junio. Los partos se producen entre junio y entre finales de agosto y finales de octubre.

- Comportamiento

Especie sedentaria que puede utilizar los mismos refu época de cría las hembras forman color permanecen solitarios. Empieza su actividad a plena luz, cazando en vuelo bajo

Pipistrellus pipistrellus (Mu
enano)

- Hábitat

Quiróptero de hábitos fisurícolas. Se refugia durante todo el
año en grietas y oque
construcciones huma
durante la hibernació
incluso los más huma



- Alimentación

Dípteros Nematoceros (so
Anisopodidae), Tricóp

- Reproducción

Partos entre fines de mayo

- Comportamiento

De sedentario a migrador
son más gregarias du
invierno. Los machos
año; mantienen territorios. Forman harenes de hasta 13
hembras.

Pipistrellus pygameus

Murciélago de Cabrera

- **Hábitat**

Hábitos fisurícolas. Se refugia en grietas y oquedades de árboles, rocas, construcciones humanas; también ocupa cajas-refugio. Se sitúan en las cercanías de zonas con agua.



- **Alimentación**

Pequeños dípteros. Entre las presas secundarias se han detectado *Trichoptera, Hymenoptera, Coleoptera Sternorrhyncha, Planipennia* y *Homoptera*.

- **Reproducción**

Similar al murciélago enano. Los machos defienden refugios de apareamiento y territorios desde los que emiten llamadas sociales en vuelo para atraer a las hembras.

- **Comportamiento**

Actividad crepuscular y nocturna. El área de campeo de una colonia de cría alcanza hasta 7,3 km2 y la máxima distancia al refugio 2,3 km. Especie sedentaria.

Plecotus austriacus

Orejudo gris

- **Hábitat**

Los hábitats de alimentación son muy variados, desde bosques y áreas semiforestales a zonas de cultivos y paisajes abiertos sin cobertura arbórea. Puede utilizar una amplia gama de refugios aunque parece una especie claramente antropófila.



- **Alimentación**

Se le considera un especialista en grandes lepidópteros nocturnos. Y en menor proporción, dípteros y coleópteros.

- **Reproducción**

Las cópulas tienen lugar durante el mes de septiembre. A partir de junio las hembras se agrupan, segregadas de los machos. La mayoría de los nacimientos tienen lugar en la segunda quincena de junio.

- **Comportamiento**

Comportamiento solitario excepto en los momentos relacionados con la reproducción. Es una especie esencialmente sedentaria.

Familia *Rhinolophidae*

- **Género *Rhinolophus***

Rhinolophus euryales

Murciélago de herradura mediterráneo

- **Hábitat**

Especie termófila, ocupando fondos de valle. Cavernícola tanto para la cría como para la hibernación. Su hábitat de campeo ligado a zonas con cobertura vegetal boscosa o arbustiva.



- **Alimentación**

Los lepidópteros nocturnos representan la presa más importante en su dieta, aunque en primavera consume coleópteros.

- **Reproducción**

Comienzan a congregarse en los refugios de cría desde mediados de marzo hasta principios de junio.

- **Comportamiento**

Especie gregaria, especialmente en época de cría. Las colonias de cría se asocian con otras especies. Especie sedentaria que efectúa movimientos estacionales. Captura sus presas bien volando o al acecho desde perchas. Las distancias máximas a las áreas de campeo no superan los 10 km

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

- **Hábitat**

Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con preferencia por zonas arboladas con espacios abiertos.

- **Alimentación**

La dieta se compone principalmente de lepidópteros, ortópteros y coleópteros.



- **Reproducción**

Los nacimientos se escalonan desde finales de mayo a finales de julio.

- **Comportamiento**

Especie gregaria y sedentaria que forma colonias. Especie sedentaria. Las áreas de caza se encuentran entre 200 y 1.000 m de distancia de sus refugios. En estas zonas utilizan posaderos nocturnos donde permanecen colgados hasta que localizan una presa sobre la que se abalanzan.

Rhinolophus hipposiderus

Murciélago pequeño de herradura



- **Hábitat**

De carácter cavernícola con predilección por las cavidades naturales. Frecuenta áreas de cubierta vegetal arbustiva y arbórea con presencia de aguas superficiales.



- **Alimentación**

La dieta está compuesta por dípteros nematóceros, lepidópteros y neurópteros, capturados en vuelo entre 2 y 5 m de altura. Pueden capturar insectos no voladores a nivel del suelo.

- **Reproducción**

Las colonias de cría están constituidas fundamentalmente por hembras. El parto y la crianza se da entre junio y julio.

- **Comportamiento**

No comparte refugio con ninguna otra especie en época de cría. De carácter solitario. Es una especie sedentaria.

Rhinolophus mehelyi

Murciélago mediano de herradura



- **Hábitat**

Especie troglófila estricta y termófila, que habita cuevas y minas. Ocupa refugios cálidos y húmedos buscando refugios más fríos para la hibernación. Hábitats de caza adehesados con arbolado diverso.



- **Alimentación**

La dieta se basa en lepidópteros aunque aparecen otros insectos voladores de alas grandes como neurópteros, o dípteros.

- **Reproducción**

Las colonias de cría en nuestro territorio suelen estar formadas por varios centenares de individuos, aunque en poblaciones más pequeñas pueden parir solas.

- **Comportamiento**

Especie gregaria, sobre todo en los períodos de cría e hibernación. Suele compartir refugio con otras especies cavernícolas. Realizan cortos desplazamientos entre los refugios de cría, hibernación y de transición.

Familia *Molossidae*

- **Género *Tadarida***

Tadarida teniotis

Murciélago rabudo

- **Hábitat**

Los refugios se sitúan en farallones rocosos, acantilados marinos y estructuras artificiales como puentes y edificios. Se alimentan por encima de núcleos habitados y espacios abiertos en un amplio rango altitudinal.



- **Alimentación**

Especializados en el consumo de insectos blandos: lepidópteros y neurópteros.

- **Reproducción**

Los partos tienen lugar preferentemente entre junio y julio, integrándose los harenes antes y después de la cría.

- **Comportamiento**

Existencia de harenes, constituidos por un macho y un pequeño grupo de hembras Son territoriales y posiblemente migradores.